

EL ABORTO QUIMICO

La RU 486, un esteroide que actualmente está registrado comercialmente como Mifégyne (mifepristona)

La RU 486 mata a bebés por nacer de hasta las 9 semanas de concebidos y es dañina, y a veces mortal, para las mujeres. Entre los efectos dañinos se encuentran dolorosas contracciones, náuseas, vómitos, diarrea y abundante hemorragia que dura días. Por lo menos una de cada 100 mujeres necesita ser hospitalizada después de tomar estas píldoras. Además se requieren varias visitas al médico y en algunos casos se recurre al aborto quirúrgico para completar la extracción de los pedazos del bebé que han quedado dentro de la madre.


Más tarde, en 1990, un grupo internacional de científicos y médicos con sede en el Hospital Necker de París, revisó los datos de 30,000 mujeres que habían usado la RU 486 y emitieron un severo aviso en contra de este fármaco. En él urgían al Ministerio de Salud a "exigir lo que era inevitable: la suspensión inmediata de la distribución y el uso de la RU 486 debido a los graves efectos colaterales del aborto químico, que es falsamente visto como una alternativa al aborto quirúrgico". Su preocupación se debió a que en muchos de los casos ocurrieron hemorragias severas que hubo

que tratar con curetages y transfusiones de sangre debido a los bajos niveles de hematocritos y hemoglobina, y dos casos severos de accidentes cardiovasculares relacionados con la adición de las prostaglandinas a la RU 486.

Roussel Uclaf reveló que la prostaglandina Nalador, usada independientemente de la RU 486, tuvo que ver con la muerte de tres mujeres, y que otras cuatro habían sufrido ataques cardíacos aunque no murieron.

Existen además muchas mujeres que no deben usar la RU 486 debido a su historial clínico, tales como los casos de alergias (incluyendo el asma), la epilepsia, la insuficiencia adrenal, enfermedades del riñón, los desordenes gastro-intestinales y los desórdenes del hígado o de los pulmones. Las mujeres que han estado bajo tratamiento con esteroides en los últimos 12 meses también quedan excluidas.

Los medicamentos anti inflamatorios, tales como una simple pastilla de aspirina, son conocidos como inhibidores prostaglandinos. Por tanto, su uso simultáneo con la RU 486 puede resultar en un aborto incompleto, lo cual es muy peligroso. (*Vida Humana Internacional*)



Fetus in ninth week of development



8 y 9 semanas

TESTIMONIO DE JUDITH . ABORTO QUIMICO

Soy Judith. Tengo 4 hijos. Después de el cuarto, salí embarazada otra vez. Por vergüenza, por el que dirán, decidí no tener a mi bebé. Sin consultarlo con el padre de mis hijos, fui y me deshice del problema. Bueno, eso creía que estaba haciendo. Me dieron unas pastillas que hicieron que mi bebé saliera de mi vientre. Tuve la oportunidad de conocer a mi nene . Cuando salió mi hijo, yo lo mire, lo tomé en mis manos. No quería dejarlo ir, era tan pequeño, tan inofensivo. Lo quise limpiar en el lavabo. Mi bebé se me fué de mis manos y con todas mis fuerzas en mi desesperación desarmé el tubo del lavabo, pero ya no encontré a mi nene.

Hoy me arrepiento con toda mi alma porque le quité la vida a mi hijo. Tengo 4 hijos vivos. Uno de ellos es hombrecito y él con todo su corazón me pide un hermanito y con qué cara le digo que lo hubiera tenido, pero por ignorancia y cobardía de su madre no lo tiene.

Hoy soy madre soltera, así que no tengo como darle a mi hijo un hermanito que tanto desea, ni tengo cómo quitar este dolor que llevo en mi alma bien clavado. Esto que duele como una llaga que no sana.

Mujer, tener un bebé es una bendición. Por favor piénsalo . No le quites la oportunidad de vivir. No te vas a arrepentir cuando ese bebé te bese y te abrace y te diga que te ama.

Yo no lo dejé y me duele en el alma porque desearía que el mío me abrazara tan siquiera por un momento.



EL ABORTO QUIMICO CON PASTILLAS

- Mata de hambre al nuevo ser.
Provoca contracciones.
 - Es traumático para la mujer ver a su hijo muerto y tener que deshacerse del cuerpo de su bebé.
 - Riesgo de hemorragia y ruptura del útero. Bebé de 6 semanas
 - Riesgo de embolia.
- Se ha reportado dolor pélvico, placenta retenida, sangrado genital severo, shock y muerte materna y del bebé.
Puede causar aborto incompleto que requiere hospitalización y cirugía.*

www.embarazoinesperado.com

www.optionline.org

Linea de Ayuda gratuita

ESTADOS UNIDOS 1 800 712 4357

MEXICO 01 800-624-8632